

【肺炎】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
4月	3月23日	11日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	レボフロキサシン錠250mg 1錠×4、喀痰吸引、酸素0.5/min、 ダゾピペ2.25g 1瓶+生理食塩液 100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋 +ソルデム3 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×2、ダゾピペ 2.25g 3瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデ ム3 500ml 1袋×4、ソルデム1 500ml 1袋×1
	4月18日	11日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5/min、 タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム3 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ配 合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋 +ソルデム3 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食 塩液 100ml 2瓶×3、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 1瓶×2、ロセフィン静注用0.5g 4瓶+生理食塩液生理食塩液 100ml 2瓶×2、ロセフィン静注用0.5g 2瓶+生理食塩液生理食塩液 100ml 1瓶×1
5月	5月5日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×4、(頓用)カロナール200mg×2、 喀痰吸引、 タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩液100ml 1瓶×1、タゾピペ 配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液100ml 2瓶+ソルデム3 500ml 2 袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液100ml 2瓶+ソ ルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルラクトD 500ml 1袋×1

	5月11日	17日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	<p>オーグメンチン250RS 375mg 3錠×4、アルピニー坐剤100mg×2、喀痰吸引、酸素1/min、</p> <p>タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×3、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 1瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ピクシリン注射用注射用0.25g 1瓶＋生理食塩液100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ピクシリン注射用注射用0.25g 1瓶＋生理食塩液100ml 1瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ピクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ピクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ピクシリン注射用注射用0.25g 1瓶＋生理食塩液100ml 1瓶×1</p>
	5月20日	12日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	<p>喀痰吸引、酸素0.5/min、</p> <p>タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ピクシリン注射用注射用0.25g 1瓶＋生理食塩液100ml 1瓶×2</p>

6月	6月6日	22日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	<p>オーグメンチン250RS 375mg 3錠×7、アルピニー坐剤100mg×3、喀痰吸引、</p> <p>ビクシリン注射用注射用0.25g 1瓶＋生理食塩液100ml 1瓶＋ソルデム3輸液 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1輸液 500ml 1袋＋ソルラクトD輸液 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1輸液 500ml 1袋＋ソルデム3輸液 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルラクトD輸液 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルラクト3輸液 500ml 1袋×1、ロセフィン静注用0.5g 2瓶＋生理食塩液生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1輸液 500ml 1袋＋ソルラクトD輸液 500ml 1袋×7、ロセフィン静注用0.5g 2瓶＋生理食塩液生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1輸液 500ml 1袋＋ソルデム3輸液 500ml 1袋×6、ソルデム1輸液 500ml 1袋＋ソルデム3輸液 500ml 1袋×1、ソルデム3輸液 500ml 1袋×2、ソルラクトD輸液 500ml 1袋×1</p>
	6月11日	10日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	<p>ユナシン錠375mg 3錠×4、アルピニー坐剤100mg ×1、喀痰吸引、</p> <p>ロセフィン静注用0.5g 2瓶＋生理食塩液生理食塩液100ml 1瓶×4</p> <p>ロセフィン静注用0.5g 2瓶＋生理食塩液生理食塩液100ml 1瓶＋ソルラクトD輸液 500ml 1袋×2</p>
7月	7月26日	5日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査、胸部レントゲン	<p>レボフロキサシン粒状錠250mg 1包×6、(頓)カロナール錠200mg 1錠、喀痰吸引、酸素0.5～1ℓ/min、</p> <p>ダゾピペ2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶×1</p>

8月	8月21日	10日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査、胸部CT	喀痰吸引、酸素0.5ℓ/min ソルデム1 500ml 1袋×2、ダゾピペ2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 1瓶+ソルラクト3 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×2、ダゾピペ2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム3 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml ×1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×2、ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×1、ソルデム3 500ml 1袋×1
10月	10月13日	8日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5~1ℓ/min レボフロキサシン250mg 1錠×2、(頓用)カロナール200mg ダゾピペ2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 2瓶×5
11月	11月7日	11日	聴診、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×4、喀痰吸引 タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩液100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液100ml 2瓶+ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液100ml 2瓶+ソルラクトD 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶+生理食塩液100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×2
	11月28日	3日	聴診、血液検査	喀痰吸引 タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶+生理食塩液100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶+生理食塩液100ml 1瓶+ソルデム3 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶+生理食塩液100ml 1瓶+ソルラクトD 500ml 1袋×1、
12月	11月28日	2日	聴診、血液検査	喀痰吸引 タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩液100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1

3月	3月18日	9日	聴診、血液検査	喀痰吸引 タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソラクトD 500ml 1袋×1、ソラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋×1、ソルデム3 500ml 1袋×1
	3月28日	4日	聴診、血液検査	喀痰吸引 タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソラクトD 500ml 1袋×1

【尿路感染症】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
4月	4月1日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 2錠×4
	4月1日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	4月17日	6日	尿検査	レボフロキサシン250mg 3錠×6
5月	5月23日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 3錠×4、(頓用)カロナール200mg
6月	6月23日	8日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×10
	6月27日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×7
7月	6月23日	2日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×10
	6月27日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×7

	7月17日	6日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg、ソルデム1 500ml 1袋×1、
	7月21日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	7月26日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	7月27日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5、(頓用)カロナール錠200mg ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×1
8月	7月27日	5日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5 ソルデム1 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×1、ソルラクト D 500ml 1袋×1
	8月10日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	8月11日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5、(頓用)カロナール錠200mg
	8月22日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3、(頓用)カロナール錠200mg
	8月27日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	8月31日	1日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
9月	8月31日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	9月4日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	9月12日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	9月12日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	9月16日	7日	尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×6
	9月17日	6日	尿検査、血液検査	(頓用)カロナール錠200mg、アルピニー坐剤 タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩液 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用配合静注用2.25g 2瓶+生理食塩 液 100ml 2瓶×3
	9月29日	2日	尿検査	導尿処置、レボフロキサシン250mg 1錠×3
10月	9月29日	2日	尿検査	導尿処置、レボフロキサシン250mg 1錠×3
	10月4日	4日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	10月4日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、アルピニー坐剤
	10月20日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4

	10月21日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	10月24日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
11月	11月6日	7日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×7
	11月7日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	11月7日	11日	尿検査、血液検査	導尿処置 タゾピペ2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋 ＋ソルデム3 500ml×1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 4瓶＋生理 食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋× 2、ダゾピペ2.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶×＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶＋ソルラ クトD 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用0.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用0.25g 4瓶＋生理 食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋× 1、ビクシリン注射用0.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ビクシリン注射用0.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶 ＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1 袋×1、ビクシリン注射用0.25g 4瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデ ム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋＋ ソルデム3 500ml 1袋×1、
	11月28日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
12月	11月28日	1日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	12月10日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3
	12月11日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	12月12日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3
1月	1月11日	6日	尿検査、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×6
	1月13日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	1月13日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	1月16日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
2月	2月4日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4

	2月13日	7日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、 タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用配合静注用2.25g 2瓶＋生理食 塩液 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋× 2、タゾピペ配合静注用配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 2 瓶＋ソルデム1 500ml×1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ配 合静注用配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム 1 500ml×1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ配合静注用配合 静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋 ×1
	2月22日	2日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×2
	2月26日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	2月26日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール錠200mg
3月	2月26日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	2月26日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール錠200mg
	3月9日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	3月12日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	3月17日	5日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	3月27日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4

【蜂窩織炎】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
--	-----	------	------	----------

4月	4月7日	6日	血液検査	ビクシリン注射用注射用0.25g 2瓶＋生理食塩液100ml 1瓶×1、ビクシリン注射用注射用0.25g 4瓶＋生理食塩液100ml 2瓶×5
5月	5月7日	3日	血液検査	ビクシリン注射用注射用0.25g 1瓶＋生理食塩液100ml 1瓶×
7月	7月1日	6日	血液検査	アルピニー坐剤100mg、 タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム3 500ml 1袋×1、ソルラクトD 500ml 1袋×1
12月	12月31日	1日	血液検査	タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶×1
1月	12月31日	5日	血液検査	タゾピペ配合静注用2.25g 2瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶×4
	1月6日	4日	血液検査	タゾピペ配合静注用2.25g 1瓶＋生理食塩液 100ml 1瓶×4